


装置の説明 (DBS)

年 月 日

この度、_____さんに装着した矯正装置（ブレース）は、

- | | | | |
|---|--|------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> メタルブラケット | | ロッキーマウンテンモリタ社製 | 日本 |
| <input type="checkbox"/> トラセラム Torayceram® | | "TORAY"社 | 日本 |
| <input type="checkbox"/> インスパイア！ inspire ice™ | | Ormco社 | 米国 |
| <input type="checkbox"/> クリアティアー Clearly™ | | 3M Unitek社 | 米国 |
| <input type="checkbox"/> インビュー InVu™ | | TP Orthodontics社 | 米国 |
| <input type="checkbox"/> リンガルブラケット Lingual System, 7th. | | Ormco社 | 米国 |
| <input type="checkbox"/> リンガルブラケット Stealth | | American Orthodontics社 | 米国 |
| <input type="checkbox"/> リンガルブラケット STb Light Lingual System | | カンノ/オームコジャパン | 日本 です。 |



■この装置の**使用期間**は、約 年 ヶ月 ~ 年 ヶ月を予定しています。この期間は、患者さまの歯並びの種類や程度、あるいは治療方法によって違います。

※当クリニックでの平均的な治療期間（動的治療期間：歯の移動を開始して保定装置を装着するまでの期間）は約2年です。しかし、「顎の骨の過成長や劣成長」、「装置やエラスティックの使用時間の不足」、「日々の口腔清掃の不備」、「装置の破損」や「何回もの予約変更やキャンセル」などは治療期間の延長に影響します。また、これらは「治療結果の質」にも関連することもご了承ください。

■1本1本の歯にくっつけた小さな矯正装置（ブレース）に、針金（ワイヤー）が結び付けてあります。自分では取り外しができませんので、次の事項に十分気を付けて下さい。

- 3～6週間隔での来院時にワイヤーを調節したり、交換します。**ワイヤーを調節した後の違和感（歯が浮いたような感覚）は、通常は24-48時間続きます。**これは、歯を動かすための新しい力が加わるためで、日がたつにつれてなくなりますので心配はいりません。1週間を過ぎても変わらない場合は連絡して下さい。
- ブレースはいくつもの小さな器具からできています。ゆるみや破損、口のまわりへの打撃などによって、頬の内側や唇が傷つくこともあります。ブレースやワイヤーが頬や唇に当たって痛む場合は、お渡ししている**ワックス**を使って応急処置をしてください。
- 何かこわれたり、緩くなっているのに気づいた場合は、直ちにご連絡ください。
- 装置にくっつきやすい食べ物（ガム、キャラメル、おもちなど）は、食べないようにして下さい。また、固い食べ物（氷・煎餅・あめ など）を咬むときも注意して下さい。ワイヤーが変形したり、ブレースが取れたりすると、歯が違う方向へ動き、治療期間が長くなります。
- 食事の後は必ず歯を磨いて下さい。特に**ワイヤーの下、ブレースと歯肉の間**は、汚れが付き易くなります。鏡を良くみて磨いてください。通常10分以上の時間がかかります。